

人類乳突病毒(HPV)疫苗接種注意事項

什麼是 HPV？

人類乳突病毒 (human papillomavirus, HPV) 是有性經驗的男女皆可能感染的病毒，傳染力極強。大多數 HPV 感染不會產生任何症狀，並會被免疫系統自行排除，若持續的感染，可能導致癌前病變或癌症。高風險的 HPV (16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 型) 可導致子宮頸癌、陰道癌及外陰癌，肛門或口咽癌。低風險的 HPV (如 6, 11 型) 可以導致尖形濕疣 (生殖器疣俗稱菜花)。

HPV 疫苗的接種時程？不同廠牌可以交替接種嗎？

HPV 疫苗通常在 6 個月的時間內接種 3 劑。沒有接種完 3 劑或沒有按期程接種可能會影響 HPV 疫苗效果，如因故未能按期程接種，請回門診諮詢後，再繼續接種完後續的疫苗。此外不同廠牌的 HPV 疫苗建議不要交替接種。

哪些人不建議施打疫苗？

接種 HPV 疫苗後曾出現過敏症狀者、懷孕或準備懷孕的婦女不建議接種。若接種 HPV 疫苗後意外懷孕，應先停止疫苗的接種直到懷孕結束，不建議中止懷孕。

注射後可能副作用及疫苗反應

接種 HPV 疫苗可能發生的常見不良反應為注射部位疼痛、腫脹、發癢、輕微發燒、頭痛、頭暈等，大多數屬輕微至中等程度且為時甚短。

貼心提醒

- 接種疫苗後請稍坐休息並觀察 30 分鐘，若無不適症狀時再離院。
- 接種 HPV 疫苗之後，仍需注意安全性行為，以及 30 歲之後須定期接受子宮頸抹片檢查。
- 接種疫苗後，請多喝水、多休息，減少不適之反應，若有任何疑問請回診。

桃新凡事用心  聯新國際醫院 桃新分院 對您無限關心

總機：03-3325678 預約專線：03-3326161