


減痛內視鏡檢查後注意事項


- 一.減痛內視鏡檢查後藥物反應：口乾、視力模糊、心悸、小便困難、頭暈、嗜睡等副作用，皆為暫時性現象。檢查當日及返家後，家屬需注意受檢者安全避免跌倒。
- 二.檢查結束請採漸進式下床：
 - 1.先坐於床緣1-2分鐘，沒有頭暈不適才可下床。
 - 2.下床時請穿好鞋子，勿打赤腳或直接穿襪子走。
 - 3.在床緣慢慢站起，原地踏步數次，若覺得頭暈無力，應立即蹲下或坐下，避免進一步活動影響個人安全。
- 三.檢查後會留院觀察30分鐘，如無不適方可離院，請勿搭乘機車，宜陪伴者開車或搭乘計程車較安全。
- 四.檢查完30分鐘，若無頭暈、嘔吐情形，可先喝少許溫水，若無噎到即可恢復飲食。

桃新凡事用心  聯新國際醫院 桃新分院 對您無限關心
諮詢電話：(03)332-5678

制定日期：2014/08/20
最新審閱日期：2021/07/06
最新修訂日期：2020/07/30

減痛內視鏡檢查後注意事項

- 一.減痛內視鏡檢查後藥物反應：口乾、視力模糊、心悸、小便困難、頭暈、嗜睡等副作用，皆為暫時性現象。檢查當日及返家後，家屬需注意受檢者安全避免跌倒。
- 二.檢查結束請採漸進式下床：
 - 1.先坐於床緣1-2分鐘，沒有頭暈不適才可下床。
 - 2.下床時請穿好鞋子，勿打赤腳或直接穿襪子走。
 - 3.在床緣慢慢站起，原地踏步數次，若覺得頭暈無力，應立即蹲下或坐下，避免進一步活動影響個人安全。
- 三.檢查後會留院觀察30分鐘，如無不適方可離院，請勿搭乘機車，宜陪伴者開車或搭乘計程車較安全。
- 四.檢查完30分鐘，若無頭暈、嘔吐情形，可先喝少許溫水，若無噎到即可恢復飲食。

桃新凡事用心  聯新國際醫院 桃新分院 對您無限關心
諮詢電話：(03)332-5678