

B 型肝炎疫苗接種注意事項

B 型肝炎 (Hepatitis B)，可經由含有 B 型肝炎病毒的血液或體液透過皮膚或黏膜進入人體內而感染。感染途徑包括水平傳染及垂直傳染，水平傳染途徑經由輸血、打針、刺青、紋眉、穿耳洞、共用牙刷或刮鬍刀、以及性行為等感染，垂直感染是指帶原的媽媽在生產前後把 B 型肝炎病毒傳染給新生兒，台灣有 40~50% 的比例經由此途徑傳染。

接種禁忌

發高燒、先前接種本疫苗或對本疫苗任何成分曾發生嚴重過敏反應者。

注射後可能副作用及疫苗反應

接種後甚少有特別反應，接種部位可能有紅、腫、疼痛情形，偶有發燒、倦怠，通常 1~2 天即消失。

貼心提醒

- 接種疫苗後請稍坐休息並觀察 30 分鐘，若無不適症狀時再離院。
- 請注意回診時間 接受完整疫苗保護。
- B 型肝炎疫苗：依醫師評估，接種 1 劑或 3 劑
第 2 劑量：在首次劑量的 1 個月後
第 3 劑量：在首次劑量的 6 個月後。
- 接種疫苗後，請多喝水、多休息，減少不適之反應，若有任何疑問請回診。

桃新凡事用心  聯新國際醫院 桃新分院 對您無限關心

總機：03-3325678 預約專線：03-3326161