

A 肝疫苗接種注意事項

A 肝疫苗是注射型的不活化疫苗，一般建議施打 2 劑，採肌肉注射，在施打第一劑滿 1 個月之後約有 95% 的人可以產生抗體，兩劑需間隔 6~12 個月，在施打第 2 劑之後，幾乎 100% 的成年人都可以產生抗體，一般可以提供 20 年的保護力。

接種禁忌

發高燒、1 歲以下嬰兒的人，對懷孕的影響目前還不明確。

注射後可能副作用及疫苗反應

接種後甚少有特別反應，接種部位可能有紅、腫、疼痛情形，偶有發燒、倦怠，通常 1~2 天即消失。若發燒超過 38.5°C 以上且持續超過 2 天，請回院就診。

貼心提醒

- 接種疫苗後請稍坐休息並觀察 30 分鐘，若無不適症狀時再離院。
- 請注意回診時間 接受完整疫苗保護。
- A 型肝炎疫苗：共 2 劑；第 2 劑量在首次劑量的 6~12 個月後。
- 接種疫苗後，請多喝水、多休息，減少不適之反應，若有任何疑問請回診。

桃新凡事用心  聯新國際醫院 桃新分院 對您無限關心

總機：03-3325678

預約專線：03-3326161