

肺炎鏈球菌疫苗接種注意事項

1. 接種後可能發生的反應及注意事項

- 1.1 接種後可能發生注射部位紅腫反應等症狀，通常接種 2 天內會恢復。
- 1.2 發燒、倦怠等較嚴重副作用則極少發生。
- 1.3 接種後如有持續發燒、嚴重過敏反應，如呼吸困難、氣喘、昏眩、心跳加速等不適症狀，應儘速就醫，請醫師做進一步的判斷與處理。

2. 未接種 13 價結合型肺炎鏈球菌疫苗可能引起之後果

肺炎鏈球菌是人類重要且常見的細菌，可引起嚴重的肺炎、菌血症、敗血症、腦膜炎等侵襲性感染與併發症，甚或導致死亡。任何人都可能感染肺炎鏈球菌，而我國侵襲性肺炎鏈球菌感染症主要發生在 5 歲以下的幼童；病患常需要加護病房治療，嚴重的需切除部份肺葉及緊急開刀以挽救生命或造成其他嚴重之後遺症。

3. 注射後可能副作用及疫苗反應

- 3.1 13 價結合疫苗 (PCV13) 常發生的副作用為：注射部位局部紅腫、硬塊、皮膚炎、發燒 (通常不會超過 39 °C)。其他較少見的不良反應：嘔吐、拉肚子。
- 3.2 23 價多醣體疫苗 (PCV23)，較常發生的副作用，為注射部位局部疼痛、紅疹、溫熱感、硬塊，其他較少見的不良反應，包括發燒、噁心、嘔吐。

4. 接種禁忌及注意事項

- 3.1 接種疫苗後請稍作休息並觀察 30 分鐘，若無不適症狀時再離院。
- 3.2 接種疫苗後，請多喝水、多休息，減少不適之反應，若有任何疑問請回診。
- 3.3 之前接種本疫苗或對疫苗之任何成分 (包括白喉類毒素) 曾發生嚴重過敏反應者。
- 3.4 發燒或正罹患中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。
- 3.5 出生未滿 6 週。
- 3.5 其他經醫師評估不適合接種者。



出自「桃園疫苗小巴特」

桃新凡事用心



聯新國際醫院 桃新分院

對您無限關心

總機：03-3325678

預約專線：03-3326161