

麻疹/腮腺炎/德國麻疹疫苗接種注意事項

麻疹與德國麻疹都是急性上呼吸道感染以後，在身上出現皮疹。因為疫苗接種的推行，台灣近年來比較少見這種疾病。麻疹的危險性在於幼兒，會引發腦炎與其他細菌感染而危及生命。德國麻疹最值得注意的併發症是孕婦感染，會導致胎兒的先天性畸形。腮腺炎除了引起腮腺發炎以外，會有生殖腺發炎的併發症，尤以成人為然，近年來台灣地區的病例數逐漸減少，這與大規模注射疫苗有關。

特殊禁忌

對蛋白有立即型過敏反應者，應該避免接種麻疹疫苗。這是因為麻疹疫苗是由雞胚胎製成，可能會引起對雞細胞成份的過敏反應。與一般的活性疫苗一樣，懷孕的時候不可以接種這類活性疫苗，而且在疫苗注射後三個月以內都應該避免懷孕。

副作用

接種麻疹疫苗以後，約有 5-10%會在 5-10 天以後出現輕微發燒，甚至紅疹，可能持續 2 至 5 天。德國麻疹疫苗的副作用包括了關節痛、關節炎（罕見）與神經炎等。這些副作用在小孩的發生率為 1-3%，成人的發生率則較高，約在 10-30%之間，尤其以女性較為常見。腮腺炎疫苗有 5%會引起輕微發燒，少數在接種疫苗以後 7 至 10 天出現腮腺炎。

貼心提醒

- 接種疫苗後請稍坐休息並觀察 30 分鐘，若無不適症狀時再離院。
- 接種疫苗後，請多喝水、多休息，減少不適之反應，若有任何疑問請回診。

桃新凡事用心  聯新國際醫院 桃新分院 對您無限關心

總機：03-3325678

預約專線：03-3326161