

帶狀疱疹疫苗接種注意事項

1. 疾病簡介

帶狀疱疹是水痘-帶狀疱疹病毒（varicella-zoster virus）再活化的表現，此種病毒初次感染時會引發水痘，之後此病毒會潛伏在背根神經節或腦感覺神經節中，直到再度活化引發帶狀疱疹。帶狀疱疹一般特徵為沿著皮節分布的單側性、疼痛性、水泡性皮炎。

2. 認識疫苗

帶狀疱疹疫苗是一種活性減毒疫苗，可提高水痘-帶狀疱疹病毒特异性免疫力，有效減少成人之帶狀疱疹發作機會，並可有效減少 67% 疱疹後神經痛。

3. 自費接種建議

50 歲(含)以上未曾接種過帶狀疱疹疫苗者，不論之前是否有水痘或帶狀疱疹病史，建議接種 1 劑活性減毒帶狀疱疹疫苗，保護效果能維持 5-10 年。

4. 接種禁忌

- 4.1 先前接種本疫苗或對本疫苗任何成分曾發生嚴重過敏反應者。
- 4.2 已知患有嚴重免疫缺失者（包括嚴重免疫不全的愛滋病毒陽性個案、先天性免疫缺失症與白血病、淋巴瘤等惡性腫瘤病人或接受化療、免疫抑制藥物治療及高劑量類固醇者）。
- 4.3 孕婦。

5. 注意事項

- 5.1 發燒或正患有急性中重度疾病者，宜待病情穩定後再接種。
- 5.2 接種前 24 小時內曾接受特定抗病毒藥物者(如：acyclovir、famciclovir 或 valacyclovir)，於接種後間隔 14 天以後再重新開始服用這些藥物。
- 5.3 女性接種後 4 週內應避免懷孕。
- 5.4 與其他活性減毒疫苗，如 23 價肺炎鏈球菌疫苗，應間隔至少 28 天以上。
- 5.5 可以和流感疫苗同時施打。
- 5.6 曾發生帶狀疱疹的病人，可於發病後間隔 1 年再接種即可。

6. 接種後可能發生的反應

- 6.1 接種部位可能有發紅、疼痛或腫脹等局部反應。
- 6.2 可能有頭痛、手臂或腿部疼痛之現象。
- 6.3 接種疫苗後請稍作休息 30 分鐘，若無不適症狀時再離院。
- 6.4 若以上症狀持續或更嚴重，請立刻就醫。

備註：本文參考衛生福利部衛教單張及神經內科吳奇霖醫師建議內容。

制定日期：2021/02/19
最新審閱日期：2023/11/14
最新修訂日期：

總機：03-3325678

預約專線：03-3326161